



## Valeurs d'alertes en Hémostase

En Hémostase, les critères d'alerte sont essentiellement définis par le risque hémorragique. Les résultats critiques sont téléphonés par le Biologiste/interne en période de jour ou par le technicien habilité en période d'astreinte, de garde et éventuellement de nuit. Dans ces cas, le résultat est communiqué par téléphone au service et est tracé dans le SGL.

- TQ < 30% (en dehors d'un traitement AVK ou hormis un contexte clinique compatible)
- FV ou FII < 25% en dehors d'une antériorité récente
- INR > 5
- Fibrinogène < 1 g/l (hormis un contexte clinique compatible)
- Activité anti Xa HNF > 0.7 UI/ml \*\*
- Activité anti Xa HBPM  $\geq$  1.5 UI/ml \*\* (Innohep, Lovenox)
- AOD Xarelto Activité anti Xa direct > 400 ng/ml \*\*
- AOD Eliquis Activité anti Xa direct > 350 ng/ml \*\*
- AOD Pradaxa Activité anti IIa direct > 300 ng/ml\*\*
- Activité anti Xa Orgaran > 0.8 U/ml\*\*
- Activité anti Xa Arixtra > 1.9  $\mu$ g/ml \*\*
- Activité anti IIa Arganova > 1  $\mu$ g/ml \*