AP-HP. Hôpitaux universitaires Henri-Mondor

PREVENTION, DIAGNOSTIC ET TRAITEMENT DES INFECTIONS (Pr J.M. PAWLOTSKY)

PCR BIOLOGIE MOLECULAIRE

VIR

Version 2024

Etiquette Patient

Etiquette Service

Contact labo : 14828

Prescripteur :

Préleveur :

☐ Pas de résultats Cyberlab
☐ Essai clinique

Jour ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23 ☐24 ☐25 ☐26 ☐27 ☐28 ☐29 ☐30 ☐31

Mois ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 ☐6 ☐7 ☐8 ☐9 ☐10 ☐11 ☐12

Heures ☐00 ☐01 ☐02 ☐03 ☐04 ☐05 ☐06 ☐07 ☐08 ☐09 ☐10 ☐11 ☐12 ☐13 ☐14 ☐15 ☐16 ☐17 ☐18 ☐19 ☐20 ☐21 ☐22 ☐23

Minutes ☐00 ☐15 ☐30 ☐45

Renseignements cliniques:

☐ **Immunodépression : préciser** .....

☐ **Autres indications: préciser** .....

☐ **Protocole**

PCR — BIOLOGIE MOLECULAIRE HEPATITES VIRALES — PCR

Examens à ne pas prélever la nuit, le week-end et les jours fériés

Charges virales (Détection / Quantification par technique de PCR) :

☐ **Charge virale VHB** *ADN*

☐ Génotypage de résistance aux antiviraux VHB

☐ **Charge virale VHD** *ARN*

☐ **Charge virale VHC** *ARN*

☐ Génotypage du VHC

☐ Génotypage de résistance aux antiviraux VHC

☐ **Charge virale VHE** *ARN*

tube EDTA 7 ml

2 tubes par case cochée

tube sec avec gel 7 ml

PCR — BIOLOGIE MOLECULAIRE VIH — PCR

Examens à ne pas prélever la nuit, le week-end et les jours fériés

Charges virales et/ou génotypage VIH :

☐ Plasma **2 tubes EDTA**

☐ LCR (1,2 ml)

☐ Charge virale VIH 1

☐ Charge virale VIH 2 *Examen externé*

Génotypage de résistance aux antirétroviraux

☐ Reverse Transcriptase + Protéase + Intégrase

☐ ARN ☐ ADN **1 tube EDTA**

Indication obligatoire : .....

Réservé à l'usage exclusif des clients externes

PCR — BIOLOGIE MOLECULAIRE AUTRES VIRUS — PCR

Sang : *sur tube EDTA (bouchon violet)*

☐ CMV
☐ EBV
1 tube EDTA (4 ml)

☐ HSV 1+2
☐ VZV
☐ Adénovirus
1 tube EDTA (4 ml)

☐ BKV
1 tube EDTA (4 ml)
1 tube stérile pour les urines

☐ Parvovirus B19
☐ HHV6
1 tube EDTA (4 ml)

Prélèvement cutanéo-muqueux

☐ HSV 1+2 ☐ VZV (1écouvillon eSwab)

☐ Entérovirus (1écouvillon eSwab supplémentaire)

Localisation: .....

LCR : *1 tube stérile*

4 marqueurs (sauf entérovirus) : 500 µl
Entérovirus : 200 µl

☐ HSV 1+2
☐ VZV
☐ Entérovirus
☐ CMV
☐ EBV
☐ HHV6
☐ JCV
☐ Adénovirus

Pour tout autre pathogène, faire une demande de Métagénomique : feuille de demande NGS

Moelle osseuse : *1 tube EDTA*

☐ Parvovirus B19 ☐ CMV ☐ EBV

Biopsie : *1 tube stérile*

☐ HSV 1+2 ☐ VZV ☐ CMV

Localisation: .....

Autre type de prélèvement : *1 tube stérile*

☐ HSV 1+2
☐ CMV
☐ HHV6
☐ JCV
☐ VZV
☐ EBV
☐ Entérovirus
☐ Adénovirus
☐ Parvovirus B19

Localisation: .....

Recherche de virus dans les selles

☐ Norovirus ☐ Adénovirus / Rotavirus

MONKEYPOX virus : Triple emballage (95 kpa) OBLIGATOIRE

☐ Eswab cutané ☐ Eswab génital ☐ Autre (après accord du biologiste)

Localisation : .....

Cadre réservé au laboratoire

☐ NC Ident ☐ NC Presc ☐ NC Prél ☐ NC Trans ☐ NC Labo ☐ Tubes surnuméraires ☐ Tri Pré Ana

Réservé à l'usage exclusif des clients externes